

# وسائل

## استخدام

## علاجات

## الريبو

### استخدام الأدوية بطريقة صحيحة عند نوبة الريبو

- يجب تناول العلاج الموصوف وإتباع الإرشادات الطبية للحماية من نوبات الريبو.
- إتباع المريض إرشادات الطبيب سوف تجنبه المضاعفات الخطيرة.

- يجب استخدام موسع الشعب الهوائية (البخاخ الأزرق) قبل مضاد التهاب (البخاخ البرتقالي/البني) إذا تم الجمع ما بين الأدوية. كما يجب الانتظار خمس دقائق بعد أخذ البخاخ الأزرق لأخذ البخاخ البرتقالي/البني).
- في حالة استخدام البخاخ الأزرق: إذا كانت الجرعة بختين، تؤخذ البخة الأولى ثم الانتظار دقيقة واحدة ثم تؤخذ البخة الثانية.

### الدواء (البخاخ) البرتقالي أو البني (الكورتيزون - البخاخ الوقائي)

يجب على كل مريض أن يأخذ هذا الدواء كل ١٢ ساعة (صباحاً و مساءً) سواء كانت لديه نوبة أم لا، والاستمرار فيه حتى الموعد القادم

مع الطبيب، فمثلاً تؤخذ بخة أو بختين حسب وصفة الطبيب، في الساعة ٦ صباحاً و الساعة ٦ مساءً مع الانتظار لمدة دقيقة مابين البختين.

### الدواء (البخاخ) الأزرق:

#### (فتولين - موسع الشعب الهوائية)

يستخدم هذا البخاخ عند الضرورة فقط عند ظهور أعراض نوبة الريبو وهي:

- ضيق وصعوبة في التنفس.
- جريان الأنف والزكام.
- الرشح أو إرتفاع الحرارة.
- نزول الدموع و حكة في العين.
- الإصابة بالتعب و التنفس من الفم.
- صعوبة في النوم.

وهنا يجب استخدام البخاخ و عدم الانتظار حتى لا تسوء الحالة.

## هام جداً:

في حالة عدم استجابة المريض للعلاج الموسع للشعب الهوائية أو في حالة ضيق التنفس الشديد و صعوبة في الحديث أو تغير في لون شفتي المريض (زرقة) أو إنخفاض شديد في معدل الجهد التنفسي للمريض يجب: الإستمرار في إعطاء المريض جرعات من الفنتولين لتوسيع الشعب الهوائية ٤-٢ بخات كل ١٥ - ٢٠ دقيقة أو ١٠ بخات من خلال جهاز الإستخدام والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى أو مستوصف.

## ملاحظات هامة:

- أخذ البخاخ حسب وصفة الطبيب.
- غسل الفم بعد البخاخ البرتقالى، البنفسجي أو البني.
- الحرص على توفر البخاخ.
- استخدام الجهاز المخصص عند أخذ البخاخ.
- استخدام البخاخ باستمرار.
- كلما تم الإسراع بأخذ العلاج كلما تم الحصول على نتيجة أفضل.

## استخدام الأدوية بعد إنتهاء أعراض الربو:

- إيقاف البخاخ (الأزرق) و إستخدامه عند الحاجة لكي يساعد على التخلص من أعراض الربو:
  - الكحة من غير الزكام و السعال.
  - صوت صفير.

## طريقة استخدام البخاخ:

- رج البخاخ
- ضع البخاخ في الجهاز المخصص له.
- أضغط على البخاخ.
- أترك الجهاز لمدة ١٠ ثوانى على الوجه.
- الإنستاندار دقيقة واحدة فقط ثم تكرار نفس الطريقة إذا كانت بختين.

- ضيق في الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس.

أحياناً تنتهي هذه الأعراض بأخذ بخة واحدة من البخاخ الأزرق. إذا استمرت هذه الأعراض مع التهاب الصدر فيجب أخذ البخاخ كل ٨-٦ ساعات حتى تنتهي الأعراض.

- الاستمرار في إستخدام البخاخ (البرتقالى أو البني) كل ١٢ ساعة حسب التعليمات، ثم العودة إلى المعدل المعتمد بعد انتهاء الأعراض.

- من المهم مراجعة الطبيب في حالة أي أعراض مستجدة، كما أنه من المهم المتابعة بعد استقرار الحالة و معainنة اختبار الجهد التنفسي (فحص وظيفة الرئة) للمريض.